

PCI（経皮的冠動脈形成術）の治療予定・・・手首・ひじからの場合

担当医師
担当看護師

様

	1日前	手術当日	1日後
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> ◆手術の流れがわかる。 ◆不安の表出ができ、治療が受けられる。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆安静の必要性が理解できる。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆退院後の生活について理解できる。 ◆異常なく退院できる。
日付	1日前	当日	1日後
投薬・注射 手術	<p>自宅で飲んでいる薬がある場合は看護師にお渡しください。</p>	<p> / () :</p> <p>手術の予定です。手術用の服に着替え、紙パンツに履き替えます。</p> <p> ◆手術準備のための点滴があります。</p> <p> ◆朝から抗生剤のお薬を飲んでいただきます。手術30分前に安定剤を飲んでいただきます。</p> <p> ◆眼鏡、入歯、コンタクトレンズ、指輪、アクセサリなどははずしてください。 ◆マニキュアは除去してください。 ◆時間になりましたら車椅子に乗って手術する部屋に移動します。終了後も車椅子でお部屋に帰ります。 ◆カテーテル挿入部分を止血バンドで止血し、心電図のセンサーを装着します。 ◆止血が出来たら止血バンドをはずします。</p> <p>◆手術後、酸素チューブを装着します。</p>	<p> ◆点滴は終了です。</p> <p> ◆医師の診察後に心電図のセンサーをはずします。</p>
検査	<p> 心電図検査があります。</p>	<p> 手術終了後、心電図検査があります。</p>	<p> ◆心電図があります。10時までには検査室に行って頂きます。 ◆血液検査があります。</p>
リハビリ			
食事	<p>減塩食になります</p> <p>〈手術が1番目の場合〉 夕食後より食べられません。 水分は取ってもかまいません。</p>	<p> 〈手術が1番目の場合〉 朝食は食べられません。手術開始1時間前からは水分も摂れません。 〈手術が2番目以降の場合〉 朝食は食べられます。手術開始1時間前からは食事でも水分も摂れません。手術の時間によっては昼食が遅れたり食べられないこともあります。 ◆血糖降下薬は絶食の分は中止となります。</p>	
生活 (安静度◆ 観察)	<ul style="list-style-type: none"> ◆制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆終了後6時間で腕を固定している固定板をはずします。手首の場合は手首を曲げたり動かさないようにしてください。肘の場合、重たいものを持つなど強い負担を与えないでください。 ◆止血バンドが外れるまで安静度は看護師の指示に従ってください。トイレに行く場合、一回目は看護師が付き添いますので連絡してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆朝、医師の診察の時に止血バンドを外します。止血バンドが外れた後も、出来るだけ安静にしてください。
清潔	<ul style="list-style-type: none"> ◆自宅で入浴を済ませてきてください。(病院でもシャワーは可能です) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆シャワー・入浴は出来ません。 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ◆入院時より足首にリストバンドをつけます。(本人確認の為) ◆両足の動脈の位置にペンで印をつけます。 ◆手術当日についてのDVDを見てください説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆退院までに食事について、栄養士からの指導があります。(最近1ヶ月以内ぐらいに既に指導を受けている場合、行わないこともあります。) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆医師の診察が有ります。 ◆看護師による退院指導があります。