

心臓カテーテル検査の治療予定・・・ソケイ部の場合

担当医師

担当看護師

様

	1日前	検査当日	1日後
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆検査の流れがわかる。</li> <li>◆不安の表出ができ、検査が受けられる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆安静の必要性が理解できる。</li> <li>◆検査後の合併症状を訴えることができる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆退院後の生活について理解できる。</li> <li>◆異常なく退院できる。</li> </ul>
日付	1日前	当日	1日後
投薬・注射 手術	<p>自宅で飲んでいる薬がある場合は、看護師にお渡し下さい。</p>	<p> / ( ) :</p> <p>検査の予定です。検査用の服に着替え、紙パンツに履き替えます。</p> <p> ◆検査準備のための点滴があります。</p> <p> ◆検査30分前に安定剤を飲んでいただきます。</p> <p>◆眼鏡、入歯、コンタクトレンズ、指輪、アクセサリーなどははずしてください。 ◆マニキュアは除去してください。 ◆時間になりましたら車椅子に乗って検査する部屋に移動します。終了後は下肢を動かすことが出来ませんのでベッドでお部屋に帰ります。 ◆カテーテル挿入部分を止血バンドで止血し、心電図のセンサーを装着します。 ◆止血が出来たら止血バンドと心電図のセンサーをはずします。  ◆検査後数時間で点滴は終了です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆医師の指示があったり、検査の終了時刻が遅い場合は、翌日まで点滴が続くことがあります。</li> </ul>
検査		<p> 検査終了後、心電図検査があります。</p>	
リハビリ			
食事	<p>減塩食になります。</p> <p>〈検査が1番目の場合〉 夕食後より食べられません。 水分は摂ってもかまいません。</p>	<p> 〈検査が1番目の場合〉 朝食は食べられません。検査開始1時間前からは水分も摂れません。 〈検査が2番目以降の場合〉 朝食は食べられます。検査開始1時間前からは食事水分も摂れません。検査の時間によっては昼食が遅れたり食べられないこともあります。 ◆血圧低下薬は絶食の分は中止となります。</p>	
生活 (安静度 ◆観察)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆制限はありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆検査終了後、ベッド上で安静にして、刺した部位を約6時間圧迫します。検査を行った側の足は曲げないでください。</li> <li>◆止血が出来たら止血バンドと心電図のセンサーをはずします。</li> <li>◆排泄は尿器・便器を使いベッド上で行いますので、ナースコールを鳴らしてください。</li> <li>◆医師の許可があれば約6時間でトイレと洗面だけは歩行が出来ます。</li> <li>◆食事の時のみ少しベッドを上げます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆医師の許可があるまでは安静にしてください。</li> </ul>
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆自宅で入浴を済ませてきてください。(病院でもシャワーは可能です。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆シャワー・入浴は出来ません。</li> </ul>	
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆入院時よりリストバンドをつけます。(本人確認の為)</li> <li>◆両足の動脈の位置にペンで印をつけます。</li> <li>◆検査当日の流れについてDVDを見ていただき説明があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆退院までに食事について、栄養士からの指導があります。(最近1が月以内ぐらいに既に指導を受けている場合、行わないこともあります。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆医師の診察が有ります。</li> <li>◆看護師による退院指導があります。</li> </ul>